

## WYKAZ DOPUSZCZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SEZONIE 2021

Podstawą opracowania powyższego niepełnego wykazu był rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wg stanu na dzień 29.01.2021 r.

Rejestr wszystkich dopuszczonych i zarejestrowanych środków ochrony roślin jest zamieszczony na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rowoju Wsi.

### Bez czarny

| L.p.   | Zwalczane szkodniki, choroby | Nazwa środka             | Dawka na 1 ha                       | Karencja w dniach          | Uwagi   | Substancja czynna       |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| 1  | fuzarioza                    | ASPERELLO T34 BIOCONTROL | 10g/1m <sup>3</sup> podłoża,        | nd                         | Środek stosować:<br>1) przed sadzeniem: wymięszać środek z podłożem, stosować max 1 raz,<br>2) po wysadzeniu sadzonek: opryskiwać powierzchnię  | trichoderma asperellum  |
|  |                              | XILON WP                 | 0,5 g/ 1 m <sup>2</sup> powierzchni | nd                         |   | trichoderma asperellum  |
| 2  | opuchlak truskawkowiec       | MET52 GRANULAR           | 0,5 kg/m <sup>3</sup>               | nd                         | Środek można stosować przed sadzeniem lub we wszystkich fazach wzrostu roślin. Maksymalna liczba zabiegów w okresie wegetacyjnym -2, odstęp co najmniej 7 dni. Środka nie należy stosować w dniu zbioru owoców. | metargizium anisoplicia |
|  |                              | 1020                     | 0,5 kg/m <sup>3</sup>               | nd                         |   | metargizium anisoplicia |
| HERBICYDY  |                              |                          |                                     |                            |   |                         |
| L.p.   | Substancja aktywna           | Nazwa środka             | Dawka na 1 ha                       | Uwagi dotyczące stosowania |   |                         |
| Brak zarejestrowanego środka do zwalczania chwastów w uprawie czarnego bzu. Najlepiej jest w międzyrzędach pozostawić pas muraw, który należy systematycznie kosić. Dobrą metodą jest zastosowanie ściółki w międzyrzędach, która również ogranicza, a także zatrzymuje wilgość w glebie ograniczając jej parowanie. |                              |                          |                                     |                            |   |                         |

nd - nie dotyczy

#### UWAGA :

**Odpowiedzialność za skuteczność działania <sup>(1)</sup> i fitotoksyczność <sup>(2)</sup> danego środka ochrony roślin stosowanego w wymienionej uprawie ponosi wyłącznie jego użytkownik !**

(1) skuteczność działania : środki stosować zgodnie z przeznaczeniem po dokładnym zapoznaniu się z etykietą, dobrać właściwy środek, nie dopuszczać do przekraczania dawek , okresów karencji, nie opóźniać zabiegu, przechowywać środki ochrony roślin w szczelnie zamkniętych pojemnikach

(2) fitotoksyczność : niekorzystny wpływ "toksyczny" substancji na rośliny, np. przekraczanie dawek środków ochrony roślin w zabiegach agrotechnicznych, tj. pestycydów, herbicydów lub fungicydów

**Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją załączoną w etykiecie.**